ملخص

الأهداف

تصف هذه الدراسة – لتى تجرى لأول مرة فى سياق مستشفى تعليمى بمصر - ممارسات الولادة الطبيعية، إذ يعتبر نزيف ما بعد الولادة المسبب الرئيسى لوفيات الأمهات فى البلاد. تصف الدراسة أنماط ادارة المرحلة الثالثة من الولادة ومقارنتها بالممارسات الطبية القائمة على أساس البراهين. كما تقوم بفحص و استطلاع الأسباب الكامنة وراء ممارسات المرحلة الثالثة.

تصميم الدراسة:

تمت ملاحظة 176 ولادة طبيعية بشكل مباشر، و أجريت مقابلات مع النساء فى مرحلة بعد الولادة، كما شارك مقدمو الخدمات فى مناقشة نتائج الدراسة. تم اجراء الادارة النشطة للمرحلة الثالثة بنجاح على 15% من النساء اللاتى تمت ملاحظتهن. أما أكثر الانحرافات التى اختبرتها نسبة ال 85% من النساء المتبقية فقد كانت كالآتى: اعطاء عقارات مهبلية utetronic بعد الولادة السرية placental (65%) وبدون شد الحبل السرى (49%)، ولم تجرى الادارة السلبية على أى من النساء اللاتى تمت ملاحظتهن.

الاستنتاجات:

الدور الوقائى الذى تلعبه الادارة النشطة فى المرحلة الثالثة ضد نزيف ما بعد الولادة لم يمارس فى أغلب الولادات التى تمت ملاحظتها. لابد من استطلاع المعوقات التى تحول دون تبنى البروتوكولات التى اتضح دورها فى التقليل من النزيف، خاصة بالنظر الى مساهمة نزيف ما بعد الولادة فى وفيات الأمهات فى مصر

Cherine, Mohamed, Karima Khalil, Nevine Hassanein, Hania Sholkamy, Miral Breebart and Amr El Noury. 2004. "Management of the third stage of labor in an Egyptian teaching hospital", *Journal of Gynecology and Obstetrics* 87(1): 54-58